



Huszár Aktív Plusz, az új magyar huszár

A jodoszulfuron hatóanyagú Huszár hazánkban 2001-ben került bevezetésre. Népszerűsége elsősorban azokban a gabonatermesztő körzetekben töretlen, ahol a „szokásos” kétszikű gabonagyomok mellett a ragadós galajjal, a mezei acattal és a jelentős egyszikű gyomok közül a nagy széltippannel is meg kell küzdeni.

A Huszár Aktív Plusz összetétele és formulációja

A Huszár Aktív Plusz az immár klasszikus jodoszulfuron és mefenpir széfener mellett egy további – az ALS-gátlók csoportjába tartozó hatóanyagot – a tienkarbazon-metil, és a hormonhatású 2,4-D EHE-t is tartalmaz:

10 g/l jodoszulfuron,
7,5 g/l tienkarbazon-metil,
300 g/l 2,4-D és
30 g/l mefenpir-dietil széfener

A Huszár Aktív Plusz formulációja a jól megszokott olajos diszperzió (OD), így a felhasználás szempontjából ugyanazokat az előnyöket hordozza magában, mint elődje. A benne lévő segédanyagoknak köszönhetően alkalmazásához nem szükséges semmilyen adalékanyag adjuváns hozzáadása.

A Huszár Aktív Plusz hatásmódja és biológiai hatása

Az új készítményünk gyomirtó hatóanyagai két teljesen különböző hatásmódot képviselnek. A jodoszulfuron és a tienkarbazon-metil a HRAC „B” hatóanyag csoportba

tartoznak, hatékonyan gátolják az acetolaktát-szintetáz (ALS) enzimet, az aminosav-bioszintézis első enzimét, megakadályozva ezzel a fehérjeszintézist. A gyomok növekedésgátlása általában a kezelés után egy napon belül bekövetkezik, majd a kezelt gyom fokozatosan, 4-6 hét alatt elpusztul.

A 2,4-D a HRAC „O” hatóanyag csoportba tartozik.

A fenoxi-ecetsavak leveleken keresztül szívódnak fel és bekerülnek a növény osztódó szövetébe, valamint eljutnak a gyökerekbe is.

Nem fenntartható növekedés alakul ki, ami szárcsavarodást, levélszáradást, végül a gyomnövény pusztulását eredményezi. Ezenfelül a 2,4-D „aktivátor” szerepet is betölt, kiegészíti a szulfonil-karbamid hatást: gyorsítja a tünetek kifejlődését, az ALS-gátlókra kevésbé érzékeny kétszikűek esetén javítja a hatékonyságot is.

Hatásspektrum

A Huszár Aktív Plusz kiváló hatékonysággal rendelkezik a fontos egy- és kétszikű gabonagyomok ellen: nagy széltippán, vadzab, kanáriköles és perjefélék, mezei acat, ragadós galaj, árvalévesű napraforgó, parlagfű, ebszékfűfélék, mezei pipitér, pipacs, tyúkhúr, szarkalábfélék, vadrepce, pásztortáska, búzavirág, repcsényretek, disznóparéjfélék, a fehér libatop, veronikafélék, árvacsalánfélék, mezei árvácska és a zsombor. Fontos szempont, hogy a készítmény az IMI és SU toleráns napraforgó és az IMI toleráns repce árvalévesek ellen is teljes hatékonysággal rendelkezik.

Felhasználási javaslat

A Huszár Aktív Plusz őszi búzában, tritikálében és rozsban használható fel a bokrosodás közepétől egy szárcsomós állapotig, egységesen 1,0 l/ha dózisban.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót. A használat során tartsa be a címkén és a termékek engedélyokiratában szereplő előírásokat!

