



Luna[®]
MAX

Kettős hatás, ép termés

Új erővel a szőlő lisztharmat ellen!

A Bayer törekvése, hogy mindig egy lépéssel a kórokozók előtt járjon, az idei évben kerül bevezetésre a Luna család **legújabb tagja a Luna Max**.

A Luna Max **válasz napjaink** kémiai növényvédelmének két legnagyobb **kihívására**, a növényvédő szerek kivonására és a kórokozók rezisztensé válására. Két felszívódó hatóanyag ideális kombinációját tartalmazza: a **spiroxamin** egy kimondottan gyorsan felszívódó hatóanyag, a másik a pedig a már jól ismert **fluopiram**.

A Luna Max **új színt és lendületet hoz** a szőlőlisztharmat elleni védekezésbe. A két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag nem csak a rezisztencia-kezelés modern követelményének felel meg, de gyorsabbá és még hatékonyabbá teszi ezt a készítményt.

- *Hosszú hatástartam*
- *Beépített rezisztencia-kezelés*
- *Gyors hatás*
- *Egészséges termés*



Gombaölő permetezőszert **borszőlő védelmére**



Luna[®] MAX

Előírt növényvédelmi technológia

Felhasználását preventíven, azaz a fertőzést megelőzően kijuttatva javasoljuk. A két hatóanyag a szőlőlisztharmat minden fejlődési stádiumában **blokkolja a gomba növekedését**, ezért a Luna Max rendelkezik kuratív és eradikatív aktivitással is. A **Luna Max kuratív hatása** során a lisztharmat gombaszövedékét maradéktalanul elpusztítja, még a rezisztenciát mutató törzsekét is.

A készítményt borszőlőben lisztharmat ellen előrejelzésre alapozva, **megelőző jelleggel** célszerű kijuttatni. Az első kezelést virágzás időszakban javasolt elvégezni. A fertőzési nyomástól függően a kezelés egy további alkalommal megismételhető a fűrtlehajlás kezdetéig.

A készítmény egymást követő, blokkyszerű alkalmazása nem javasolt.

Kultúra	Károsító	Kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		Kezelés ideje fenológia szerint
				szer (l/ha)	víz (l/ha)	
Szőlő (bor)	lisztharmat	2	10	0,7 – 1,0	200 – 1000	Fűrtkezdemények határozott láthatóvá válásától (BBCH 53) a fűrtlehajlás kezdetéig (BBCH 73)

A Luna Max összetétele:

75 g / l fluopiram



200 g / l spiroxamin

- *Hosszú hatástartam*
- *Beépített rezisztencia-kezelés*
- *Gyors hatás*
- *Egészséges termés*



A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót. A használat során tartsa be a címkén és a termékek engedélykijelentésében szereplő előírásokat!

