

Egy valóban új eszköz a cseresznyelégység elleni védekezésben!



A cseresznyelégység elleni védekezés kétségtelenül az egyik legösszetettebb feladat a növényvédelemben. A rendelkezésre álló rovarölő szerek számának folyamatos csökkenése, valamint a termésátvételnél megkövetelt közel zéró tolerancia rendkívüli kihívást jelent a termelők számára. A Sivanto Prime rovarirtó szer engedélyokirat kiterjesztése lehetővé teszi az idei szezontól a termék alkalmazását cseresznye és meggy kultúrákban, mely megbízható és hatékony megoldást nyújt a jelentős kártevők ellen.

A **cseresznyelégység kártétele gyorsan kritikus szintet érhet el**, ami önmagában is komoly kihívást jelent. Az egyöntetűen kezelt ültetvényekben az alacsony egyedsűrűség miatt a sárgalapok gyakran aluljelzik a rajzást, így nehezítik a védekezés időzítését. Ezzel szemben a lerázatlan meggy fokozott fertőzési forrást jelent, ami a következő évben rendkívül magas nyomást eredményezhet. Mindez olyan összetett helyzetet teremthet, ahol a **pontos előrejelzés, a jól időzített beavatkozás és a megfelelő hatóanyag kiválasztása elengedhetetlen** a tiszta termés biztosításához.

A cseresznyelégység életciklusában 15-16 °C alatt gyakorlatilag semmilyen aktivitás nem történik. A rajzás kezdetén esetleg lerakott néhány tojás halandósága rendkívül magas, hiszen a gyümölcs ekkor még kemény, így ezekből a **korai tojásrakásokból nem származik érdemi fertőzési nyomás**.

Vizsgálatainkban a kontakt-piretroidok magas fertőzési nyomás mellett gyakran nem bizonyulnak elég hatékonynak, a gyümölcshéj alá került tojások ellen nem hatnak, és erős napsütésben gyorsan lebomlanak. Emiatt a védekezés időzítése kritikus, mert a készítmények hatástartama korlátozott és csak a kifejlett egyedeket éri el.



A túl merev permetezési gyakorlat, „minden héten egy kezelés szigorúan 7 naponta” sokszor vezet problémához. Nem szeretjük kívánni a csapdafogás utáni 5-6 napot sem, amíg az érési táplálkozás miatt úgysem rak tojást az állat, viszont összevárnánk a későbbi kelést. Így értékes hatékonyságot veszítünk a túl korai kezeléssel.

Méréseink alapján **az a technológia adta a legjobb védelmet, ahol kivártuk az első állatok rajzása utáni 6-8 napot**, és figyeltük, hogy nappal pár óráig a hőmérséklet 16 °C fölé emelkedjen. Az ekkor kijuttatott felszívódó hatóanyagok, mint **a flupiradifuron nem csak a legyeket irtotta, hanem utána nyúlt a frissen kikelt tojásoknak is**. Ezt nem lehet sokáig húzni, mert a héj alól a lárvák pár nap múlva elindul a mag felé, ahol már nem tudjuk hatóanyaggal követni, de a felszívódott hatóanyag ellenáll az esőnek és a napsütés UV sugárzásának is, valódi tartamhatást is nyújtva.

TERMÉK NEVE	KULTÚRA	KÁROSÍTÓ	DÓZIS (l/ha)	A KEZELÉS IDEJE (fenológiai állapot szerint)	KEZELÉSEK MAX. SZÁMA	ÉVI
SIVANTO[®] prime	cseresznye, meggy	levéltetvek	0,625	BBCH 69-81	1	7
		cseresznyelégység	0,9	BBCH 69-81	1*	7

* ugyanazon a területen két évente használható

A **Sivanto Prime** bizonyítottan hatékony a cseresznyelégység ellen, amit felszívódó hatásmódja és stabil tartamhatása is támogat. Folyékony SL formulációja gyors permetlé-készítést és jó keverhetőséget biztosít fungicidekkel is. Erős rajzás esetén nedvesítőszer alkalmazása ajánlott a hatékonyság fokozásáért.

A Sivanto Prime számos más kultúrában és károsító ellen is használható. Mint például szilvában poloskaszagú darazsak és levéltetvek ellen.

További információért látogasson el honlapunkra a **Sivanto Prime** termékoldalára!

► agro.bayer.co.hu

SIVANTO[®]
prime

